

Flori'Nat[®] Plus

Biocontrôle bactérien de l'environnement & pédiluve sec

Composition

- Complexe bactérien lyophilisé de 6 bactéries QPS (Qualified Presumption of Safety /Liste positive EFSA)
- 2 bactéries lactiques et 4 Bacillus subtilis-like (> 105 ufc/100 g)
- Support nutritif (starter biologique)
- Support: Carbonate de calcium, Argile, fibres
- Contient de l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus



FLORI'NAT[®] PLUS

- > Gestion de la contamination environnementale globale pour baisser la pression pathogène grâce aux bactéries bénéfiques du complexe (litières, surfaces de couchage et de vie)
- > Gestion localisée de la patte en complément (pédiluve à sec)

Objectifs

Assainir la litière

- Inhibition des bactéries pathogènes grâce aux bactéries positives du complexe: **10 fois moins de flores pathogènes**
- Diminution des problèmes sanitaires

Stabiliser la litière

- Litière plus sèche,
- Curages moins fréquents,
- Economie de paille

Limiter la prolifération de pathogènes sur les sabots et dans l'environnement

- Adhésion des bactéries bénéfiques sur les sabots

Améliorer l'ambiance

- Bien être animal,
- Moins de dégagement d'ammoniac dans le bâtiment et au curage **15% de moins d'ammoniac**

Augmenter la valeur agronomique des effluents et cultures

- Plus d'azote organique **20% d'azote en plus**
- Moins de volume à épandre,
- Moins de jus au curage, stockage et épandage



Flori'Nat[®] Plus

Biocontrôle bactérien de l'environnement & pédiluve à sec

Mode d'emploi

FLORI'NA[®] PLUS s'utilise sur **litière ou surface de couchage et de vie** (logettes, sols bétonnés, caillebotis...)

BOVINS:

Utilisation	Quantité à épandre
Logettes Vaches	200 g / logette par semaine
Aire paillée Vaches	400 g / vache par semaine
Veaux	100 g / veau par semaine
Litière accumulée (> 2 mois de fréquence de curage)	400 g / vache directement sur le sol, pailler, puis de nouveau 400 g /vache sur la paille, puis 400 g / vache /semaine.

CAPRINS:

40 g/ animal/ semaine (monter à 50 g/ animal/ semaine en période de mise-bas)

FLORI'NAT[®] PLUS s'utilise en **pédiluve**, en association avec de la paille broyée pour le traitement des pattes. Faire passer les animaux dans un pédiluve contenant un mélange de 50% de FLORI'NAT[®] PLUS et 50% de paille broyée.

PHASE D'ATTAQUE: 200 g / vache / passage avec 2 passages pendant 5 à 6 jours.

PHASE D'ENTRETIEN: 200 g / vache / passage avec 2 passages 1 jour / semaine.

Peut être utilisé en Agriculture biologique, conformément au règlement (UE) N° 2018/848.

